

Corso di Laurea Ing. EA – ESERCIZI DI FISICA GENERALE – nr. 14, 24/3/2005

1. Avete un blocco di lega metallica di forma cubica con spigolo $d = 10.000$ cm. La densità di massa della lega è $\rho = 5.0 \times 10^3$ Kg/m³. Inizialmente il blocco si trova alla temperatura $T_0 = 25.000$ °C e viene quindi portato, poggiandolo su un fornello, alla temperatura finale $T_1 = 275.000$ °C; ovviamente in tutte le fasi del processo esso si trova sempre a contatto con la pressione atmosferica, che vale $P_{ATM} = 1.0 \times 10^5$ Pa.
 - a) Sapendo che il coefficiente di dilatazione termica **lineare** vale $\lambda = 2.000 \times 10^{-5}$ 1/°C, quanto vale la lunghezza d' dello spigolo del blocco quando questo si trova alla temperatura T_1 ?
 $d' = \dots\dots\dots = \dots\dots$ m
 - b) Quanto vale il volume V' alla temperatura T_1 ?
 $V' = \dots\dots\dots = \dots\dots$ m³
 - c) E quanto vale il coefficiente di dilatazione termica **volumica** λ_V ? [Dimostrate che è, “al primo ordine”, $\lambda_V \sim 3\lambda$]
 $\lambda_V = \dots\dots\dots \sim \dots\dots$ 1/°C
 - d) Quanto vale il lavoro L fatto dal blocco durante la sua espansione? [Ricordate che la pressione rimane in pratica costantemente pari a quella atmosferica]
 $L = \dots\dots\dots = \dots\dots$ J
 - e) Supponendo che il materiale abbia calore specifico $c = 2.0$ J/(Kg °C), quanto vale il calore Q che lui ha acquisito nel processo? Confrontatelo con L !
 $Q = \dots\dots\dots = \dots\dots$ J

2. Volete ripetere la storica esperienza di Joule, quella che permise di determinare l'equivalenza calore/energia meccanica. Per farlo prendete un recipiente con pareti termicamente isolate (ad esempio rivestite di polistirolo, neoprene, o altro materiale che forma strutture sottili separate da camerette d'aria). Il recipiente contiene una miscela di acqua e ghiaccio fondente in equilibrio termico fra loro. Al suo interno, inoltre, si trova un motorino elettrico che fa muovere delle palette; inizialmente il motorino è spento. Il movimento delle palette nell'acqua provoca attrito, e si supponga che **tutta** la potenza erogata dal motore sia in questo modo convertita in potenza che serve per riscaldare il sistema acqua+ghiaccio.
 - a) Quanto vale la temperatura T del sistema?.
 $T = \dots\dots\dots$ °C
 - b) Il motorino viene acceso; sapendo che la sua potenza meccanica è $W = 9.0$ W, qual è la massa di ghiaccio M che si scioglie per ogni secondo? [Esprimete il “tasso” di fusione del ghiaccio, ed usate come calore latente di fusione (specifico) del ghiaccio il valore $\lambda_F = 3.0 \times 10^5$ J/Kg]
 $M = \dots\dots\dots = \dots\dots$ Kg/s

3. La misura del “potere calorico” di una sostanza (esempio, un alimento o un combustibile) viene spesso eseguita con le cosiddette “bombe calorimetriche”: la sostanza viene inserita, in piccole quantità, all'interno di un recipiente massiccio, di capacità termica nota. Usando un innesco (esempio una scarica elettrica) ed iniettando nella camera del comburente (esempio ossigeno) si fa in modo che l'intera quantità di sostanza bruci **rapidamente**. L'aumento di temperatura del recipiente dà allora informazioni sul potere calorico da determinare. La vostra bomba calorimetria è costituita da un recipiente di ferro di massa $m_F = 10$ Kg, a cui è collegato in contatto termico un termometro.
 - a) Supponendo che il calore specifico del ferro (alle temperature di interesse per l'esperimento) sia $c_F = 450$ J/(Kg K), quanto vale la capacità termica C della bomba?
 $C = \dots\dots\dots = \dots\dots$ J/K

- b) Immaginate ora che il termometro sia costituito da un sottile tubicino di vetro **indeformabile** contenente dell'alcool etilico (coefficiente di dilatazione termica **volumica** $\lambda_V = 1.1 \times 10^{-4} \text{ 1/}^\circ\text{C}$). Osservate che, in seguito alla combustione della sostanza incognita, la colonnina di alcool passa da una lunghezza iniziale $h_0 = 40.0 \text{ cm}$ ad una lunghezza finale $h = 41.1 \text{ cm}$ (dopo aver aspettato abbastanza tempo affinché tutto il calore della sostanza si sia trasferito alla bomba e di qui alla colonnina di alcool). Quanto vale l'aumento di temperatura ΔT registrato?
 $\Delta T = \dots\dots\dots = \dots\dots \text{ }^\circ\text{C}$
- c) Sapendo che avete inserito nella bomba calorimetria una quantità $m = 100 \text{ g}$ di sostanza incognita, quanto vale il potere calorico specifico c della sostanza? [Esprimetelo in Kcal/(100 g), come per le merendine!]
 $c = \dots\dots\dots = \dots\dots \text{ Kcal/(100 g)}$
4. Supponete che l'aria sia costituita da molecole di azoto (massa $M = 28.0 \text{ u.m.a.}$, cioè unità di massa atomica – prendete $1 \text{ u.m.a} \sim 1.6 \times 10^{-24} \text{ Kg}$). Pesate una quantità di aria pari a $m = 4.48 \text{ g}$ e la mettete in un recipiente **deformabile**.
- a) Quanto vale il numero di moli (o grammo-moli, o grammo-molecole, per noi sono più o meno sinonimi) n del vostro campione? E qual è il numero N di molecole che lo costituiscono? [Ricordate il numero di Avogadro, $N_{AV} = 6.02 \times 10^{23}$].
 $n = \dots\dots\dots = \dots\dots \text{ moli}$
 $N = \dots\dots\dots = \dots\dots$
- b) Considerate ora il vostro campione di aria come un **gas perfetto**. Supponendo che esso occupi un volume (quello del recipiente!) $V_0 = 10.0 \text{ l}$, quanto vale la densità di massa ρ_0 ? E se lo riscaldate, aumentandone la temperatura di $\Delta T = 100 \text{ }^\circ\text{C}$, quanto viene a valere la densità ρ ? [Considerate la dilatazione termica del gas, supponete irrealisticamente che **il recipiente non abbia alcun ruolo!**]
 $\rho_0 = \dots\dots\dots = \dots\dots \text{ Kg/m}^3$
 $\rho = \dots\dots\dots \sim \dots\dots \text{ Kg/m}^3$
- c) Sapendo che il volume V_0 era occupato quando il gas si trovava a temperatura $\theta_0 = 26.8 \text{ }^\circ\text{C}$, quanto vale la pressione P_0 del campione di gas? [Ricordate che la costante dei gas perfetti vale $R = 8.314 \text{ J/(K mole)}$]
 $P_0 = \dots\dots\dots \sim \dots\dots \text{ Pa}$
- d) Tenendo conto che, per un gas perfetto biatomico quale quello che state considerando, il “numero di gradi di libertà” vale 5, quanto valgono energia cinetica media $\langle E_K \rangle$ e velocità media $\langle v \rangle$ di ogni **singola** molecola di “aria”? [Ricordate che la costante di Boltzmann vale $k_B = R/N_{AV} = 1.380 \times 10^{-23} \text{ J/K}$, e considerate il gas alla temperatura θ_0]
 $\langle E_K \rangle = \dots\dots\dots \sim \dots\dots \text{ J}$
 $\langle v \rangle = \dots\dots\dots \sim \dots\dots \text{ m/s}$